



新廣大X光化驗所有限公司

New Golden Laboratory & X-Ray Services Ltd.

香港灣仔軒尼詩道265-267號祥興大廈1樓A-B室
Flat A-B, 1/F, Chong Hing Building, 265-267 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong.
Tel : 2586 1816 Fax : 2583 9040

膀胱癌

膀胱癌是泌尿系統中常見的腫瘤，其發生與環境有密切關係，如何防範自己免受膀胱癌的侵襲，首先要對此症有所認識，並避免接觸污染源。

致病原因

膀胱癌的致病原因多與接觸或吸入致癌因子，或與體內某些代謝物及細胞基因有關。

當這些致癌因子在體內代謝後，會隨尿液排出體外，尿液中若長期含有致癌物質時，會使膀胱黏膜長期與致癌物接觸而導致細胞變性，進而演變為膀胱癌，不可不慎。

哪些人是膀胱癌的高危險群？

根據臨床統計，台灣地區罹患膀胱癌的人口，以四、五十歲以上的中老年人為主，且男性多於女性。易罹患膀胱癌的高危險群有：

1. 印染、紡織、電纜、皮革工業所使用的化學物質中含聯苯胺、甲乙苯胺等有機胺，從業人員及鄰近居民，患癌率為一般人的 30 倍。
2. 長期飲用含高濃度螢光劑的井水，除了飽受烏腳病威脅外，膀胱癌罹患率也提高了 5 倍。
3. 菸燃燒後的色胺酸代謝物，易致膀胱病變，每日菸量超過一句的癮君子，比常人多出一、五~四倍的罹患率。
4. 經常使用染髮劑、食用醃製或含亞硝酸鹽的防腐劑食品者，致膀胱癌率較高。
5. 久居空氣、水質、環境污染嚴重的地區者，罹患機率亦會提高。
6. 習慣憋尿者，尿液停留在膀胱的時間加長，易刺激膀胱癌細胞引發癌變。

呼籲上述高危險群人士：每半年作一次定期 [尿液檢查](#)，有助於癌變的早期發現。

膀胱癌的症狀

無痛性血尿是先兆罹患膀胱癌最典型的症狀，即是會出現無痛性血尿，不痛不癢很容易被人忽略，或被誤診為 [尿路結石](#) 或膀胱炎。而延誤病情。因此，萬一有下列症狀出現時，應速就醫檢查：

- 無痛性血尿：發現持續數天尿中帶血，或時而血尿、時而尿液正常的現象。

=====
本刊內所提供的醫療或保健資料內容僅供參考，並不保證該等資料能滿足或符合閣下的健康或醫療需要。個人身體狀況因人而異，如有任何疑問，閣下應向合資格醫療專業人員直接查詢。本刊資料力求準確，但本公司對其任何內容的準確性或完整性不會承擔任何責任。如閣下如因此招致直接或間接的任何身體健康或財富上的損失或傷亡，一概與本公司及有關人士無關。



新廣大X光化驗所有限公司

New Golden Laboratory & X-Ray Services Ltd.

香港灣仔軒尼詩道265-267號祥興大廈1樓A-B室
Flat A-B, 1/F, Chong Hing Building, 265-267 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong.
Tel : 2586 1816 Fax : 2583 9040

- 頻尿、尿急，但尿量少，脹痛感(可能因腫瘤堵住排尿口，造成細菌感染或脹尿)。
- 排尿困難、阻塞感。
- 腰痠痛或小腹、會陰、陰莖疼痛。

膀胱癌檢查與治療

-目前用於檢查膀胱癌的方法有：[超音波](#)、膀胱鏡、影像攝影及雷射光儀器等，其中以雷射光儀器可及早發現癌細胞，讓患者早日接受治療。

-治療方法上，依病灶程度的不同，可採取經尿道切除術、放射線治療、注射抗癌藥物等方法。通常膀胱癌一、二期時，施以經尿道切除術，防治效果不錯；第三期後則須以手術作膀胱部分切除或全切除手術。但為免走上膀胱切除等嚴重後果，醫師表示，由於膀胱癌生長緩慢，只要能早期發現，病人存活率很高。

膀胱癌復發率高

膀胱癌手術後的復發率極高，患者預後一年內最好每三個月複檢一次，一年後再改以半年追蹤一次，以期早日發現復發的癌細胞。以往在手術後，多以化學治療、放射治療或二者併治療來防止復發，但復發率仍達三成；近來醫界則以卡介苗進行膀胱注射以提高免疫力，臨床復發率約可降至 7%。

=====
本刊內所提供的醫療或保健資料內容僅供參考，並不保證該等資料能滿足或符合閣下的健康或醫療需要。個人身體狀況因人而異，如有任何疑問，閣下應向合資格醫療專業人員直接查詢。本刊資料力求準確，但本公司對其任何內容的準確性或完整性不會承擔任何責任。如閣下如因此招致直接或間接的任何身體健康或財富上的損失或傷亡，一概與本公司及有關人士無關。