



# 新廣大X光化驗所有限公司

## New Golden Laboratory & X-Ray Services Ltd.

香港灣仔軒尼詩道265-267號祥興大廈1樓A-B室  
Flat A-B, 1/F, Chong Hing Building, 265-267 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong.  
Tel : 2586 1816 Fax : 2583 9040

## 心肌梗塞

### 冠狀動脈粥樣硬化性心臟病

#### 病因：

此病病因迄今未明，可能與脂質代謝紊亂，尤其是低密度脂蛋白增高，高密度脂蛋白降低，以及隨年齡增長的動脈管壁正常結構和機能缺陷有關。高血壓、長期吸煙、糖尿病、肥胖、遺傳、A型性格、血尿酸增高以及某些內分泌病為常見的易患因素。此外，血小板和凝血機制改變在冠脈粥樣硬化形成中也具有重要作用。

#### 心絞痛

#### 癥狀：

以發作性胸痛為主要臨床表現，疼痛特點為：

1. 部位主要在胸骨體上段或中段之後，可波及心前區，有手掌大小範圍，甚至橫貫前胸，界限不清，常發射至左肩，左臂內側灼達名指和小指，或至頸、咽或下部。
2. 性質胸痛常為壓迫、發悶或緊縮性，也可有燒灼感，但不尖銳，不象針刺或刀扎痛，偶伴瀕死的恐懼感覺。發作時，病人往往不自覺地停止原來活動，直至癥狀緩解。
3. 誘因發作常由體力勞動或情緒激動（如憤怒、焦急、過度興奮）所激發，飽食、寒冷，吸煙，心動過速，休剋等亦可誘發。
4. 持續時間疼痛出現後常逐步加重、在3~5分鐘內漸消失，一般在停止原來誘發癥狀的活動後即緩解。舌下含用硝酸甘油也能在幾分鐘內使之緩解。可數天數星期發作一次，亦可一日內多次發作。

#### 體征：

平時一般無異常體征。心絞痛發作時常見心率增快，血壓升高、表情焦慮，皮膚冷或出汗，有時出現第四或第三心音奔馬律。可有暫時性心尖部收縮期

---

本刊內所提供的醫療或保健資料內容僅供參考，並不保證該等資料能滿足或符合閣下的健康或醫療需要。個人身體狀況因人而異，如有任何疑問，閣下應向合資格醫療專業人員直接查詢。本刊資料力求準確，但本公司對其任何內容的準確性或完整性不會承擔任何責任。如閣下如因此招致直接或間接的任何身體健康或財富上的損失或傷亡，一概與本公司及有關人士無關。



# 新廣大X光化驗所有限公司

## New Golden Laboratory & X-Ray Services Ltd.

香港灣仔軒尼詩道265-267號祥興大廈1樓A-B室  
Flat A-B, 1/F, Chong Hing Building, 265-267 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong.  
Tel : 2586 1816 Fax : 2583 9040

雜音，第二心音可有逆分裂或有交替脈。

### 分型：

1. 勞累性心絞痛其特點是疼痛由體力勞累、情緒激動或其它足以增加心肌需氧量的情況所誘發，休息或舌下含用硝酸甘油後迅速消失。

包括：a. 穩定型心絞痛最常見，每日和每周疼痛發作次數大致相同，每次發作疼痛的性質和部位無改變，疼痛時間相仿（3~5分鐘）。

b. 初發型心絞痛過去未發生過心絞痛或心肌梗塞，初次發生勞累性心絞痛時間未到1個月。

c. 惡性型心絞痛原為穩定型心絞痛的病人，在3個月內疼痛的頻率、程度、時限、誘發因素經常變動，進行性惡化。可發展為心肌梗塞或死亡，亦可逐漸恢復穩定型。

2. 自發性心絞痛疼痛程度較重，時限較長，不易被含用硝酸甘油所緩解。

所括：

a. 臥位型心絞痛 休息時或熟睡時發生，常在半夜偶在午睡或休息時發作。

b. 變異型心絞痛 發作時心電圖顯示有關導聯的ST段抬高，與之相應的導聯則ST段可壓低。病人遲早會發生，心肌梗塞。

c. 中間綜合征疼痛在休息或睡眠時發生、歷時較長、達30分鐘到1小時或以上，常為心肌梗塞的前奏。

d. 梗塞後心絞痛·是急性心肌梗塞發生後一個月內又出現的心絞痛。

3. 混合性心絞痛 其特點是病人既在心肌需氧量增加時發生心絞痛，亦可在心肌需氧量無明顯增加時發生心絞痛。