



# 新廣大X光化驗所有限公司

## New Golden Laboratory & X-Ray Services Ltd.

香港灣仔軒尼詩道265-267號祥興大廈1樓A-B室  
Flat A-B, 1/F, Chong Hing Building, 265-267 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong.  
Tel : 2586 1816 Fax : 2583 9040

## 睪丸癌

睪丸癌是男性獨有的惡性腫瘤，男性終其一生都應防範睪丸病變的可能性。了解睪丸癌的典型徵兆與病徵，有助於加強睪丸病變之預防。睪丸自我檢查是最好的「早期發現」措施，及時治療，治癒率可高達90%以上，且可避免終身不孕的遺憾。睪丸是主司精子生產與雄激素分泌的男性性腺，一如身體其他部位，也可能有癌細胞的發展與侵害。

睪丸癌約佔男性所有癌症的1%~2%，類型以非精原細胞癌及精原細胞癌為主，其中精原細胞癌為最大宗，佔病例的40%~70%，患者年齡以小學及20~40歲之間較多。

睪丸癌可說由小到老，任何年齡都有致病機會，男性朋友不可不慎。

## 隱睪者罹患比例高

睪丸癌的病因，目前雖無明確定論，但臨床研究卻發現，在睪丸癌患者中有30%~40%為隱睪者，且罹患精原細胞癌患者，隱睪的比例更高達九成，因此，醫師表示，曾經罹患隱睪症的患者，應該格外小心。

除了隱睪之外，睪丸發育遲緩、外傷感染、萎縮、或因遺傳、內分泌功能失調等，也是誘發睪丸癌的相關因素；若孕期中孕婦，使用女性荷爾蒙製劑，也會提高小孩罹患睪丸癌。

## 睪丸癌之典型病徵

睪丸癌罹患初期，並無明顯的不適或疼痛情形，卻可見睪丸日漸腫脹變硬，且在活動時有些重墜不適感。有些患者會有陰囊積水、男性女乳化等特殊症狀。

若是隱睪引起的睪丸癌，在睪丸隱居處將見到腫塊隆起。若腫塊壓迫淋巴管、血管或產生轉移，將使患者產生頻尿、腰酸背痛或下肢浮腫等症狀。

值得注意的是，患者多無性功能障礙，因此不易發現患病。此外，一邊睪丸患病，另一邊的睪丸致癌機率也會提高。



# 新廣大X光化驗所有限公司

## New Golden Laboratory & X-Ray Services Ltd.

香港灣仔軒尼詩道265-267號祥興大廈1樓A-B室  
Flat A-B, 1/F, Chong Hing Building, 265-267 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong.  
Tel : 2586 1816 Fax : 2583 9040

### 診斷與檢查

有睪丸癌之虞時，應請教泌尿專科醫師進行診斷與檢查。檢查重點放在陰囊內容物的鑑別，包括睪丸形狀、大小與是否疼痛，精索、副睪的位置、大小是否正確，以及陰囊中水泡含物的有無。

以燈光由側面照射睪丸，睪丸水泡體應可使燈光穿透，若有硬體腫塊，則呈黑暗。

### 早期發現治癒率高

近年來醫界的群體治療，使睪丸癌的治癒率大幅提高。癌細胞未轉移前，以手術切除患癌的睪丸效果較佳，手術後再以化學藥物或放射治療配合。若已轉移，則可用化學治療。

一般來說，睪丸癌的存活率相當高，即使在已轉移的末期，存活率仍高達八成以上。不過，男性最好經常自我檢查，把握早期發現，早期治療的佳機。

