



新廣大X光化驗所有限公司

New Golden Laboratory & X-Ray Services Ltd.

香港灣仔軒尼詩道265-267號祥興大廈1樓A-B室
Flat A-B, 1/F, Chong Hing Building, 265-267 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong.
Tel : 2586 1816 Fax : 2583 9040

胃癌

概念：

胃癌是最常見的消化道腫瘤。

病因和發病機理：

1. 外因

流行病學調查顯示胃癌與多喫腌酸菜，鹹魚，鹹肉和煙熏食物有關，甚至有人提出與喫澱粉類物質密切相關。相反，牛乳，新鮮水果，維生素以及冷藏食物能降低胃癌的危險性。

2. 內因

胃癌患者親屬中本病發病率高出正常人群的四倍。白種人中屬A型者胃癌發生率高于其它血型者。致 癌物質在有遺傳易感性的人體或許更易致癌。

3. 癌前疾病

係能演變為胃之良性胃部疾病。

1、慢性萎縮性胃炎

2、胃息肉

3、殘胃

4、胃潰瘍

5、其他

胃體萎縮性胃炎，胃血吸虫病

病理：

大體形態

1. 贅生型：呈息肉樣凸入胃腔，有蒂或無蒂，表面可有淺潰爛。

2. 潰瘍型：呈現單個可多個潰瘍，發生于凸入胃腔的癌組織；其周圍粘膜受癌細胞浸潤而隆起，強直者稱為浸潤性潰瘍，無或只有輕微浸潤者稱非浸潤性潰瘍。

3. 浸潤型：胃壁受癌腫浸潤伴纖維組織增生，可限于胃竇而造成的局部狹窄，少見者呈現彌漫性浸潤累及整個胃壁，使胃固定成一失去彈性而不能擴張的小胃囊，稱為皮革胃。

4. 表淺擴散型：僅累及粘膜表層，使粘膜增厚呈顆粒狀。



新廣大X光化驗所有限公司

New Golden Laboratory & X-Ray Services Ltd.

香港灣仔軒尼詩道265-267號祥興大廈1樓A-B室
Flat A-B, 1/F, Chong Hing Building, 265-267 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong.
Tel : 2586 1816 Fax : 2583 9040

臨床表現：

胃納不佳，食無味或體重減輕為常見之癥狀。易飽感，腹脹，咽下困難和上腹不適或嚴重的上腹鑽痛均屬後期表現。

體征以腹部腫塊為突出，多在上腹偏右近幽門處可呈結節狀，質堅定，有壓痛，可移動。肝臟因此轉移腫大在肝肋下可捫及堅硬結節，呼吸時在其表面聽到磨擦音。伴癌體征可先胃癌之察覺而出現，主要有：

1. 反復發作的血栓性靜脈炎
2. 黑棘皮病，皮膚色素沈著，尤在兩腋。
3. 皮炎。

